





КАК ЗАЩИТИТЬ МАМУ И РЕБЁНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?

РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ МИНЗДРАВА
РОССИИ





СТАТИСТИКА:

53 ТЫСЯЧИ ЖЕНЩИН,

перенесших COVID-19, зарегистрировано с 1 января по 28 октября в НМИЦ Кулакова Минздрава России и в регионах.


650 ЖЕНЩИНАМ


потребовалась искусственная вентиляция легких. 50 пациенток прошли процедуру ЭКМО.

БОЛЬШЕ 100 ПАЦИЕНТОК

мы в НМИЦ Кулакова Минздрава России потеряли. В этом году эта цифра *значительно* выше.

**ГЕННАДИЙ СУХИХ,
ДИРЕКТОР НМИЦ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И
ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМ. КУЛАКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ**





ПРОФИЛАКТИКА:

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАНИЕ

вирус прекрасно себя чувствует в кондиционированном воздухе, поэтому помещения необходимо именно проветривать.

НОСИТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ношение правильно надетых на нос и рот масок совершенно не вредит дыханию детей.



ДЕТИ ЗАРАЖАЮТСЯ В СЕМЬЕ,

поэтому мы можем утверждать, что вакцинация взрослых защищает и детей.

ДЕТИ НЕ БУДУТ БОЛЕТЬ,

если у нас будут привиты взрослые.

ВАКЦИНИРУЮЩИМСЯ ВПЕРВЫЕ


необходимо сделать прививку двумя компонентами.

ЛЕЙЛА НАМАЗОВА-БАРАНОВА,

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ДЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

МИНЗДРАВА РОССИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ





ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ:

Большие регистры и огромный международный опыт показывают, что вакцинация на любом сроке и в период лактации — это правильно. Не увеличивается ни частота преждевременных родов, ни выкидышей.

На данный момент в России 760 тыс. беременных женщин. Из них только 9 тыс. 600 привились во время беременности.



Материнская смертность выросла по отношению к данным прошлого года. Во-первых, это были непривитые женщины. Во-вторых, у этих женщин были сопутствующие заболевания. Этим женщинам мы рекомендуем в первую очередь привиться.

Каждый день у нас умирает две женщины от ковида — во время беременности или после родоразрешения. Это крайне тяжелая ситуация, поэтому необходимо очень серьезно подойти к вопросу вакцинации.


Вакцинироваться нужно до беременности. Важно помнить, что наиболее тяжело протекает ковид в третьем триместре. Важно оценить анамнез пациентки, есть ли сопутствующие заболевания.

**РОМАН ШМАКОВ,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВУ
МИНЗДРАВА РОССИИ**





ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ:

Наше исследование показывает, что на репродуктивную функцию влияет не вакцинация, а само заболевание. После перенесённого COVID-19 у женщин снижается овариальный резерв, в то время, как  после вакцинации такого не происходит.

Если женщина вакцинирована и кормит ребёнка, она, конечно, тем самым защищает и ребёнка тоже, так как передаёт ему антитела.

**НАТАЛЬЯ ДОЛГУШИНА,
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНЗДРАВА
РОССИИ ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН**

